

Tamarez de Redondo

Vass7R08s376-380




Collection Vassal-Montpellier


0Mip1092

*7 R 8 s 376-380
Tamarez de Redondo*


Tamarez de Redondo

7 R 8 s 376. 380 X









ANNEE 1991

NOM Tamariz de Redondo
mi

EMPLACEMENT 7 Rg 8 1 376.380

| Souche | Nbreyeux | Débourrement | | Nbregrap | Fertilité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|----------|--------------|--------|----------|-----------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 2 | 18.3 | 21.3 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 21.3 | 5.4 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : erige Vigueur : 2,5

29.3.91 + 11

ANNEE 1992

NOM Tamariz de Redondo
mi

EMPLACEMENT 7 Rg 8 1 376.380

| Souche | Nbreyeux | Débourrement | | Nbregrap | Fertilité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|----------|--------------|--------|----------|-----------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 3 | 19.3 | 23.3 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 19.3 | 26.3 | 0 | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

26.3.92 + 6

fasciations.

ANNEE 1993

NOM Tamariz de Redondo EMBLACEMENT 7 R80-376-380

Pgal. 2.84.

| ouche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|-------|--------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| X | | | | | 2 | 29.5 | 3.6 | 6.6 | 17.7 | 2.8 | 28 | 30.8 |
| 2 | 4 | 22.3 | 25.3 ^x | 0 | | | +4 | | | +2 | | +3 |
| 3 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 25.3 | 29.3 ^Δ | 2 | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

De 27.3, 33
 +7

ANNEE: 1994

NOM Tamariz de Redondo EMBLACEMENT 7 R80-376-380

mi.

| ouche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|-------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| X | | | | | 1 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 18.7 | 21.7 | 25.7 | 22.8 |
| 2 | 4 | | | 0 | | | +5 | | | +1 | | +2 |
| 3 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | | | 1 | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : 13 Compacité: L - M - C
 Pour : 0 Mill : 3
 Baie : TG - G - M - P Dim : 19
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

ANNEE: 1995

NCM Tamarez de Redondo

EMPLACEMENT 7 R8 A 376.380

| ouche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|-------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | | | | | 2 | 1.6 | 3.6 | 6.6 | 24.7 | 1.8 | 7.8 | 21.8 |
| 2 | 5 | | | 0 | | | +6 | | | +2 | | +1 |
| 3 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | | | | | | | | |
| | 8 | | | 2 | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : 13 Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim : 13x13
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : *erig* Vigueur : 2

ANNEE: 1996

NCM Tamarez de Redondo

EMPLACEMENT 7 R8 A 376.380

Pgal. 2.84

| ouche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|-------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 18.3 | 22.3 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 18.3 | 22.3 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

1 le 22.3.96
 (+6)

TL

ANNEE: 1998

NOM Tamariz de Redondo

EMPLACEMENT 7 R 8,376.380

ni

| Tche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|-----|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/E | fin | début | mi/v | fin | |
| ✓ | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 11 | | | 6 | 6 | 25.5 | 28.5 | 2.6 | 21.7 | 24.7 | 28.7 | 24.8 |
| 3 | 8 | | | | | | +4 | | | +1 | | +2 |
| 4 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 725 | 12 | | | 9 | | | | | | | | |
| | 23 | | | 15 | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Fort : Vigueur :

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Tamarez de Redondo
7 R8 s. 376-380 s. 2

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.
Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité
laineuse 279.
Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.
Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -
aranéuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité
pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.
Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -
sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -
sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou
cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans
villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

- Calvo 89

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Tamarez de Redondo
7R 8 s. - 376-380 s. 2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
sèteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.
subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 ^{obtus} - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 90

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Tamarez de Redondo

7 R8a-376-380a.2

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166. *au point pétiolaire*

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

Calvo 90

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Tamarez de Redondo

7 R8 s. 376.380 s.2

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 12 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoté 78 - aoté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 15 x 14).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 92

Tamarez de Redondo

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

7 R8 s-376-380 42

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 11 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 91

d'ordre :
Designation : *Tamarez de Redondo*
emplacement : *7281376.380*

Angle des nervures : 1 - (2) - 3
axe : 4 - 5 - (6)
1/L : 7 - (8) - (9)
2/L : (10) - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - (15) - (16)
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - (24)
Forme sinus pétiolaire : (25) - (26) - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - (41)
Dents (angle) : 42 - 43 - (44)
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nombre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 34